

# CORTICOIDES tópicos

¿Para qué sirven?

Para tratar procesos inflamatorios cutáneos no infecciosos por sus efectos antiinflamatorios, inmunosupresores y vasoconstrictores.

Principio activo

Hidrocortisona, butirato de hidrocortisona, aceponato de hidrocortisona, triamcinolona, betametasona, fluocinonida, flucinolona acetinado, mometasona, aceponato de metilprednisolona, beclometasona, fluticasona, metilprednisolona, clobetasol.

## CÓMO TOMARLOS

Solo deben utilizarse cuando un médico/a lo indique y siempre siguiendo la pauta establecida en cuanto a la dosis, la frecuencia, la técnica de aplicación, la extensión de la zona a tratar y la duración del tratamiento. Cada preparado contiene un corticoide de una determinada potencia y puede presentarse en diferentes formas galénicas: loción, crema, ungüento y pomada. La elección de uno u otro depende de las características de la lesión, la localización y la edad del paciente.

## INTERACCIONES

Consulte con algún profesional sanitario antes de tomar otro medicamento o planta medicinal.

## REACCIONES ADVERSAS

Cualquier efecto adverso (aunque no aparezca en el prospecto) puede comunicarlo a su profesional sanitario o directamente al Sistema Español de Farmacovigilancia en la web: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es)

## PRECAUCIONES

Proteja la medicación de la luz y del calor, guárdela en un lugar seguro y revise la fecha de caducidad.

La aplicación crónica sin periodos de descanso o de forma inadecuada pueden producir atrofia de la piel, aparición de estrías y de telangiectasias, así como potenciales efectos adversos sistémicos.

## CONSULTE SI

Le preocupa que el riesgo sea mayor que el beneficio.

## EMBARAZO Y LACTANCIA MATERNA

Se recomienda evitar durante el primer trimestre del embarazo.

Utilizar los corticoides de baja potencia, en zonas localizadas de la piel y durante cortos periodos de tiempo.

Se desconoce si los corticoides son secretados en la leche materna, no deben aplicarse en los pezones antes de la lactancia.

