

# CORTICOIDES tòpics

Principi actiu

Per a què serveixen?

Per tractar processos inflamatoris cutanis no infecciosos, pels seus efectes antiinflamatoris, immunosupressors i vasoconstrictors.

Dexametasona, prednisona, triamcinolona, betametasona, fluticasona, metilprednisolona, clobetasol.

## COM PRENDRE'LS

Només s'han d'emprar quan un metge/essa ho indiqui i sempre seguint la pauta establerta pel que fa a la dosi, la freqüència, la tècnica d'aplicació, l'extensió de la zona a tractar i la durada del tractament. Cada preparat conté un corticosteroide d'una determinada potència i es pot presentar de diferents maneres galèniques: loció, crema, ungüent i pomada. L'elecció d'un o un altre depèn de les característiques de la lesió, de la localització i de l'edat del pacient.

## INTERACCIONS

Consultau amb algun professional sanitari abans de prendre un altre medicament o planta medicinal.

## REACCIONS ADVERSES

Qualsevol efecte advers (encara que no aparegui en el prospecte) el podeu comunicar al professional sanitari o directament al Sistema Español de Farmacovigilancia a la web: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es)

## PRECAUCIONS

Protegiu la medicació de la llum i de la calor, guardau-la en un lloc segur i revisau la data de caducitat.

L'aplicació crònica sense períodes de descans o de manera inadequada poden produir atròfia de la pell, aparició d'estries i de telangièctasis, així com potencials efectes adversos sistèmics.

## CONSULTAU SI

Us preocupa que el risc sigui major que el benefici.

## EMBARÀS I LACTÀNCIA MATERNA

Es recomana evitar durant el primer trimestre de l'embaràs.

Emprar els citostàtics de baixa potència, en zones localitzades de la pell i durant curts períodes de temps.

Es desconeix si els citostàtics són secretats a la llet materna, no s'han d'aplicar en els mugrons abans de la lactància.