

Indicación	Tratamiento recomendado	Alternativa	Información adicional
Sarna clásica	<p>Permetrina tópica al 5 %*:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dos aplicaciones: día 1 y día 7 del diagnóstico. -Día 14 (visita de seguimiento): Si nuevas lesiones, administrar 1 dosis extra de permetrina 5 % e iniciar tratamiento con ivermectina. <p>Menores de 2 meses: vaselina azufrada.</p>	<p>Sospecha de baja adherencia al tratamiento, contraindicación para el uso de permetrina o imposibilidad de tratamiento tópico:</p> <p>Ivermectina vía oral (200 µg/kg de peso): Dos dosis separadas 7 días (día 1 y día 7) del diagnóstico.</p> <p>Embarazadas: vaselina azufrada.</p>	<p>TODOS LOS CASOS Y CONTACTOS DEBEN INICIAR TRATAMIENTO EL MISMO DÍA.</p> <ul style="list-style-type: none"> -El picor puede persistir hasta 4 semanas y no es indicativo de fracaso terapéutico si no hay nuevas lesiones. Puede ser necesario un tratamiento con antihistamínicos. -Derivación a dermatología: si fracaso del tratamiento. (Nuevas lesiones a los 21 días asegurando el correcto cumplimiento del tratamiento)
Sarna costrosa	<p>Terapia combinada:</p> <p>Permetrina 5 %* tópica diaria durante 7 días. Posteriormente dos veces a la semana hasta curación</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Ivermectina** (200 µg/kg de peso) /vía oral, los días 1, 2 y 8.</p> <p>En casos severos: días 1, 2, 8, 9, 15, ±21 y 29.</p>	<p>ABORDAJE HOSPITALARIO</p>	<p>Derivación a dermatología: iniciar tratamiento y derivar todos los casos de sarna costrosa.</p>
Prevención de la infección en contactos directos	<p>Permetrina tópica al 5 %*:</p> <p>Aplicación única (día 1) del diagnóstico.</p>	<p>Sospecha de baja adherencia al tratamiento, contraindicación para el uso de permetrina o imposibilidad de tratamiento tópico:</p> <p>Ivermectina vía oral** (200 µg/kg de peso): Dosis única (día 1) del diagnóstico</p>	<p>Derivación a dermatología: NUNCA.</p> <p>TODOS LOS CASOS Y CONTACTOS DEBEN INICIAR EL TRATAMIENTO EL MISMO DÍA.</p>
Abordaje de brote o alta incidencia comunitaria	<p>Ivermectina vía oral** (200 µg/kg de peso): -Dos dosis separadas por 7 días: día 1 y día 7 del diagnóstico.</p> <p>Menores de 2 meses: vaselina azufrada.</p>	<p>Contraindicación para ivermectina y embarazadas:</p> <p style="text-align: center;">Permetrina 5 % * o Vaselina azufrada***</p>	<p>Derivación a dermatología: ver derivación sarna clásica y sarna costrosa.</p> <p>Declaración obligatoria (EDO). Diagnóstico clínico o confirmado de 2 o más casos con un vínculo epidemiológico: tiempo, relación estrecha, convivencia y lugar (espacio común de relación).</p>

RECOMENDACIONES

*PERMETRINA TÓPICA 5 %

*La permetrina es segura en el embarazo y en niños mayores de 2 meses.
En menores de 2 meses puede aplicarse, previo consentimiento informado de los tutores y bajo supervisión médica (pediatría/dermatología).*

- Aplicar una capa fina de pomada antes de acostarse y dejar actuar durante 8-12 h.
- Adultos y niños mayores de 2 años: aplicar desde el cuello hasta las puntas de los pies, por toda la superficie corporal (insistir en pliegues, axilas, ombligo, zona mamaria, nalgas, muñecas, zonas interdigitales y debajo de las uñas; en niños, incluir la zona retro auricular).
- Niños menores de 2 años, personas mayores de 65 años e inmunodeprimidos: también se aplicará en la cabeza, cuello, cara y detrás de las orejas.

**IVERMECTINA VIA ORAL

En el embarazo se administrará solo si está estrictamente indicado (si no puede realizarse tratamiento tópico). No administrar en pacientes pediátricos de menos de 15 kg de peso.

- No deben ingerirse alimentos en las dos horas previas o posteriores a la administración.
- Se recomienda tomar con agua abundante por la noche, antes de acostarse.
- Está contraindicado el consumo de alcohol.
- En pacientes con disfagia y en niños pequeños, la mejor opción es triturar los comprimidos y dispersarlos en agua, administrarlos y, a continuación, administrar un vaso de agua (en caso de disfagia, con espesante si se precisa).

***VASELINA AZUFRADA

Noche 1	Noche 2	Noche 3 Ducha	7 días sin tratamiento	Noche 11	Noche 12	Noche 13 Ducha
---------	---------	------------------	------------------------	----------	----------	-------------------

- Aplicar durante 3 noches consecutivas por todo el cuerpo (evitar mucosas)
- Ducharse a las 24 h desde la última aplicación.
- Repetir la posología a los 7 días (3 noches consecutivas).
- Lavarse las manos antes y después de la aplicación.

Fórmula magistral: azufre precipitado 5-10 % en colcrem o vaselina. Disponible en RELE.

****Se consideran contactos directos las personas con las que el caso ha tenido contacto durante las 4 semanas anteriores al inicio de los síntomas (convivientes, contactos piel con piel, parejas sexuales, etc.).