

ANTIPSIQUICÒTICS intramusculars

Principio
activo

Clorpromazina, flufenazina,
levomepromazina, olanzapina,
ziprasidona, zuclopentixol,
haloperidol, aripiprazole,
paliperidona palmitato,
risperidona y sulpirida.

¿Para qué sirven?

Para tratar las psicosis, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

CÓMO TOMARLOS

Siguiendo las pautas que le ha indicado su médico/a, intente mantener siempre el mismo horario de administración.
Son de administración parenteral.

INTERACCIONES

Consulte con algún profesional sanitario antes de tomar otro medicamento o planta medicinal.

REACCIONES ADVERSAS

Cualquier efecto adverso (aunque no aparezca en el prospecto) puede comunicarlo a su profesional sanitario o directamente al Sistema Español de Farmacovigilancia en la web: www.notificaRAM.es

PRECAUCIONES

Proteja la medicación de la luz y del calor, guárdela en un lugar seguro y revise la fecha de caducidad. Utilice los inyectores suministrados con la medicación. Si no se le proporcionan, debe usar jeringas y agujas nuevas de un solo uso. Evite exponer a otras personas a los riesgos por contacto con el medicamento, especialmente a las embarazadas en el caso de la ziprasidona.

CONSULTE SI

Le preocupa que el riesgo sea mayor que el beneficio.
Ha habido cambios de tratamiento por otros profesionales.
Presenta reacciones en la zona en donde se le ha inyectado el medicamento.

EMBARAZO Y LACTANCIA MATERNA

Durante el tratamiento utilice un método anticonceptivo.
Si se queda embarazada durante el tratamiento comuníquelo a su profesional sanitario. Sólo si éste se lo indica y tras valorar el beneficio/riesgo podrá usarlo durante el embarazo o la lactancia.